

Chloorhexidine mondspoeling 0,2%

Bipharma
Weesp



Naam en samenstelling product

Chloorhexidine mondspoeling 0,2% bevat als werkzame stof chloorhexidinedigluconaat en verder alcohol 96%, pepermuntolie, sorbitol 70% en water.

Verkoopverpakking

Chloorhexidine mondspoeling 0,2% is verkrijgbaar in een kunststof flacon, voorzien van een schroefdop en maatbekertje, met 250 ml oplossing.

Werking

Chloorhexidine mondspoeling 0,2% bevat als werkzame stof chloorhexidine, die bacteriën doodt, die een infectie van de mond, tandvleesontsteking en/of tandbederf kunnen veroorzaken.

Wanneer gebruiken

Chloorhexidine mondspoeling 0,2% wordt gebruikt om een infectie in de mond te voorkomen of om tandvleesontsteking te bestrijden. Het wordt ook gebruikt om tandbederf te voorkomen, wanneer tanden poetsen niet mogelijk is.

Wanneer niet gebruiken

U mag deze oplossing niet gebruiken als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van dit product.

Bijwerkingen

Irritatie van de tong of aan de binnenzijde van de mond en een verandering van de smaak kunnen optreden. Deze bijwerkingen zijn meestal van voorbijgaande aard. Als ze toch aanhouden, moet u contact met uw arts opnemen.

De tong en de tanden kunnen een bruine verkleuring vertonen, vooral als er resten koffie, thee of wijn in de mond zitten. Deze verkleuring kunt u voorkomen door de tanden goed te poetsen met tandpasta vlak voor gebruik van de oplossing. De verkleuring van de tong en tanden verdwijnt meestal na stoppen van het gebruik.

Als u vermoedt, dat u met een bijwerking te maken heeft, die niet in deze bijsluiter staat vermeld, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw apotheker of arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit product zonder bezwaar gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

De dosering is, tenzij uw (tand)arts of orthodontist anders voorschrijft: 2 maal per dag spoelen met ongeveer 10 ml oplossing gedurende 1 tot 2 minuten. Spuug daarna de oplossing direct uit; dus niet doorslikken.

Waarschuwing:

Kinderen jonger dan 6 jaar mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.

Tanden poetsen met tandpasta kan de werking van chloorhexidine mondspoeling verminderen.

Aanbevolen wordt om tot ten minste een uur na gebruik van de oplossing de tanden niet met tandpasta te poetsen.

Wanneer chloorhexidine mondspoeling niet helpt of de klachten zich herhalen of aanhouden, moet u contact opnemen met uw (tand)arts of orthodontist en om advies vragen.

Bewaren en houdbaarheid

Bewaars de mondspoeling bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik en zicht van kinderen.

De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld na 'tenminste houdbaar tot einde'.

Als u nog vragen hebt, raadpleeg dan uw (tand)arts, orthodontist of apotheker.

Bipharma B.V. - Postbus 151 - 1380 AD WEESP

mei 2008 - 411/1