

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Hoestdrank HTP Noscapiene HCl 1 mg/ml, stroop	RVG 27161=16680	
Noscapiene HCl 1 mg/ml		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 1 van 4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Hoestdrank HTP Noscapiene HCl 1 mg/ml, stroop

Noscapiene

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Hoestdrank HTP Noscapiene HCl 1 mg/ml zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Hoestdrank HTP Noscapiene HCl 1 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Hoestdrank HTP Noscapiene HCl 1 mg/ml inneemt
3. Hoe wordt Hoestdrank HTP Noscapiene HCl 1 mg/ml ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Hoestdrank HTP Noscapiene HCl 1 mg/ml
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS HOESTDRANK HTP NOSCAPINE HCL 1 MG/ML EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep

Noscapiene onderdrukt de hoestprikkel. Noscapiene is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

Gebruiken

- bij prikkelhoest.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U HOESTDRANK HTP NOSCAPINE HCL 1 MG/ML INNEEMT

Gebruik Hoestdrank HTP Noscapiene HCl 1 mg/ml niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapiene of voor één van de andere bestanddelen van Hoestdrank HTP Noscapiene HCl 1 mg/ml.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Wees extra voorzichtig met Hoestdrank HTP Noscapiene HCl 1 mg/ml

Department of Regulatory Affairs	Date: 2013-09	Authorisation	Disk: NB/013734	Rev.: 5.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	------------------	---------------------

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Hoestdrank HTP Noscipine HCl 1 mg/ml, stroop	RVG 27161=16680	
Noscipine HCl 1 mg/ml		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 2 van 4

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Gebruik van Hoestdrank HTP Noscipine HCl 1 mg/ml met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Hoestdrank HTP Noscipine HCl 1 mg/ml en andere (genees)middelen.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend.

Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Noscipine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Noscipine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Hoestdrank HTP Noscipine HCl 1 mg/ml

Eén ml stroop bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) levert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan saccharose maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Dit product bevat methylparahydroxybenzoaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

3. HOE WORDT HOESTDRANK HTP NOSCAPINE HCL 1 MG/ML INGENOMEN

Volg bij het gebruik van Hoestdrank HTP Noscipine HCl 1 mg/ml nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Volwassenen

15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

Kinderen van 6-12 jaar

15 ml 2 tot 4 maal per dag.

Kinderen van 3-6 jaar

Department of Regulatory Affairs	Date: 2013-09	Authorisation	Disk: NB/013734	Rev.: 5.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	------------------	---------------------

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop	RVG 27161=16680	
Noscapine HCl 1 mg/ml		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 3 van 4

7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

Als u merkt dat Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u meer van Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Overgevoelighedsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

Zenuwstelsel

Sufheid, duizeligheid.

Maag- en darmstelsel

Misselijkheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U HOESTDRANK HTP NOSCAPINE HCL 1 MG/ML?

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na” of “exp.”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2013-09	Authorisation	Disk: NB/013734	Rev.: 5.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	------------------	---------------------

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop	RVG 27161=16680	
Noscapine HCl 1 mg/ml		
1.3.1.3 Package leaflet		1.3.1.3 / 4 van 4

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml

- Het werkzame bestanddeel is
noscapinehydrochloride, 1 mg per ml stroop.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
citroenzuur(E330), methylparahydroxybenzoaat(E218), saccharoïdenatrium, saccharose, frambozenessence, gezuiverd water.

Hoe ziet Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Flacon à 150 en 300 ml stroop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Healthypharm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC Etten-Leur
Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 27161=16680, Hoestdrank HTP Noscapine HCl 1 mg/ml, stroop.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2013.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2013-09	Authorisation	Disk: NB/013734	Rev.: 5.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	------------------	---------------------