

CranMed®

FORTE | CAPSULES

Voorkom herhaling en helpt bij de behandeling van blaasontsteking Te gebruiken als aanvullende therapie voor de preventie en de behandeling van de symptomen van urineweginfecties

Advies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u CranMed® Forte gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn gewijzigd volgens de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Desondanks moet u CranMed® Forte zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing; het kan nodig zijn deze tussentijds te raadplegen.

Toepassing

CranMed® Forte is bedoeld om de behandeling van urine infecties in de blaas (veroorzaakt door E. coli) te ondersteunen en helpt een terugkerende blaasontsteking te voorkomen. Een bacteriële urineweginfectie (blaasontsteking) ontstaat meestal doordat bacteriën uit de darm via de urinebuis in de urinewegen belanden, waar ze zich hechten aan de blaaswand of andere delen van de urinewegen en een ontsteking veroorzaken.

Urineweginfecties veroorzaakt door E. coli kunnen gepaard gaan (maar hoeft niet) met een of meerdere van de volgende symptomen:

- met een branderig of pijnlijk gevoel bij plassen;
- loze aandrang;
- frequent plassen;
- troebele en sterk ruikende urine;
- pijn in de onderbuik

Dosering en gebruik

Voor volwassen en kinderen van 12 jaar en ouder:

- Bij de behandeling: 2 x daags 1 capsule. Gebruik voor tenminste 7 dagen en totdat de symptomen zijn verdwenen
- Bij voorkomen: 1 x daags 1 capsule. De capsule in zijn geheel innemen.
- Innemen met water of een andere vloeistof en in zijn geheel doorslikken. Voor oraal gebruik. De dagelijkse dosering niet overschrijden, dit kan leiden tot maagklachten of oprispingen en diarree.

Gebruiksduur

CranMed® Forte dient niet langer dan 28 dagen in 1 behandelingsperiode te worden gebruikt. Na 2 dagen kan de behandeling worden hervat.

Werking

CranMed® Forte bevat een sterk geconcentreerd Veenbessen extract. Dit extract is bevat Proanthocyanidinen type A. Deze stof remt de hechting van de E. coli aan de blaas. De bacteriën worden met de urine uitgescheiden, in plaats van dat ze zich in de blaaswand nestelen.

Bijwerking(en)

Tot op heden zijn er geen bijwerkingen, bekend bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.

Gebruik tijdens zwangerschap en/ of borstvoeding

Over het gebruik van CranMed® Forte gedurende zwangerschap of de periode waarin borstvoeding wordt gege-

ven zijn geen gegevens bekend. Raadpleeg eerst uw arts of apotheker wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.



Waarschuwingen

- niet te gebruiken bij overgevoeligheid of allergie voor capsule bestanddelen;
- bij overdosering kunnen er klachten ontstaan, zoals winderigheid, buikpijn en diarree;
- buiten bereik van jonge kinderen houden;
- in geval van overgevoeligheid het gebruik van CranMed® Forte staken.

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer:

- u twijfelt of u dit product kunt gebruiken in combinatie met medicijnen;
- als symptomen verergeren of aanhouden na 7 dagen;
- bij sporen bloed in de urine;
- als u ernstige symptomen heeft zoals koorts 38°C (100.4F) of hoger, niet controleerbare rillingen, misselijkheid, braken of diarree. U kunt last hebben van een urineweg infectie van de urineleiders of nierbekken. Deze infectie heeft aanvullende behandeling nodig.
- wanneer u last heeft of in het verleden last heeft gehad van nierstenen;
- wanneer u antistollingsmiddel(en) gebruikt;
- wanneer u CranMed® Forte aan uw kind wilt geven onder de 12 jaar. Studies hebben geen veilige dosering aangetoond voor kinderen met (terugkerende) urineweg infecties.

Samenstelling

Cranberry extract, Cellulose, Hypromellose (E464), Calcium hydrogen phosphate, Stearic acid, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Red iron oxide (E172), Titanium dioxide (E171).

Bevat geen allergenen en is geschikt voor vegetariërs. Proanthocyanidinen Type A inhoud per capsule is 36 mg gebaseerd op de BL-DMAC methode.

Inhoud

14 capsules / 28 capsules / 56 capsules



Wijze van bewaren

Bij kamertemperatuur (5-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren, in de originele verpakking, buiten het bereik van kinderen



Vervaldatum

Gebruik CranMed® Forte niet na de datum op de verpakking: achter 'niet gebruiken na'.

Medisch hulpmiddel

CranMed® Forte is een medisch hulpmiddel klasse IIa, volgens de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC.

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is herzien: februari 2014 IFU: CM02-2014



PK Benelux BV,
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

CE 0481