

Tasectan®

Toepassing:

Tasectan is een medisch hulpmiddel dat de fysiologische functie van de darmwand herstelt. Tasectan is speciaal ontwikkeld om de effecten die gepaard gaan met diarree (zoals buikkrampe en overmatige ontlasting) te bedwingen en te verminderen. Tasectan helpt bij de verschillende oorzaken van diarree. Effectief binnen 12 uur.

De samenstelling van Tasectan (gelatinetannaat) verandert niet in de maag en vormt een laagje dat het darmslijmvlies beschermt, waardoor de frequentie en de duur van de diarree verminderen. Het product is verkrijgbaar als capsules voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar en als poeder voor kinderen vanaf 0 jaar.

Verpakking:

Blisterverpakking met 8 capsules van 500 mg.
10 sachets van 250 mg (voor gebruik bij kinderen).

Samenstelling:

Capsules: gelatinetannaat, maiszetmeel, magnesiumstearaat.
Poeder voor gebruik bij kinderen: gelatinetannaat.

Gebruik:

Capsules: Neem de capsules in met water.
Poeder: De inhoud kan worden toegevoegd aan de voeding of aan een kleine hoeveelheid water, melk of vruchtensap. Goed mengen en direct toedienen.

Dosering:

Volwassenen: 1 à 2 capsules om de 4 tot 6 uur totdat de symptomen zijn verdwenen.
Kinderen van 0 tot 3 jaar: 1 sachet om de 6 uur totdat de symptomen zijn verdwenen.
Kinderen van 3 tot 14 jaar: 1 à 2 sachets om de 6 uur totdat de symptomen zijn verdwenen.

Waarschuwingen:

Houd rekening met de volgende waarschuwingen:

- Het is niet nodig om voor gebruik een arts te raadplegen. Wij raden u echter aan uw arts te raadplegen bij ernstige of langdurige symptomen of indien u twijfelt aan de diagnose diarree, met name bij kinderen tot 3 jaar en ouderen.
- Met name in combinatie met andere symptomen raden we u aan een arts te raadplegen in geval van diarree bij kinderen jonger dan 3 jaar.
- Drink voldoende, desgewenst aangevuld met ORS.
- Hoewel er geen bijwerkingen bekend zijn, wordt afgeraden het product tijdens de zwangerschap of in de eerste maanden van de borstvoeding te gebruiken. Raadpleeg vóór gebruik in ieder geval altijd uw arts.
- Gebruik Tasectan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.
- Gebruik de capsule / sachet niet als de blisterverpakking of de sachet open of beschadigd is.
- Bewaar Tasectan bij kamertemperatuur, en niet in de buurt van een warmtebron.
- Vries Tasectan niet in.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

Contra-indicaties en bijwerkingen:

Tasectan mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor gelatinetannaat of één van de overige ingrediënten.