

Capsules of tabletten met 50 mg coffeïne

INFORMATIE OVER UW GENEESMIDDEL

Lees onderstaande informatie goed door voor u het middel gaat gebruiken.

Indien u iets niet duidelijk is, vraag dan de apotheek om uitleg.

Inhoudsopgave

1. Samenstelling
2. Toepassing
3. Werking
4. Overleg vóór gebruik met uw arts
5. Mogelijke bijwerkingen
6. Gebruiksaanwijzing
7. Gebruikelijke dosering
8. Bent u zwanger of heeft u kinderwens?
9. Geeft u borstvoeding?
10. Combinatie met andere geneesmiddelen

1. Samenstelling

Deze capsules (of tabletten of poeders) zijn speciaal voor u gemaakt. Ze bevatten het volgende bestanddeel:

- 50 mg coffeïne

2. Toepassing

Deze capsules worden gebruikt

- in combinatie met sommige pijnstillers, zoals paracetamol en ergotamine.
- als opwekkend middel bij vermoeidheid.

3. Werking

Coffeïne heeft een opwekkend effect. Bovendien zou het de werking van sommige pijnstillers versterken.

4. Overleg vóór gebruik met uw arts:

- als u snel last heeft van hartkloppingen of hartritmestoornissen of als u kortgeleden een hartinfarct heeft gehad.
- als u ooit last had van een maag- of darmzweer.

5. Mogelijke bijwerkingen

Over het algemeen wordt dit middel goed verdragen. Afhankelijk van de dosering en uw eigen gevoeligheid voor coffeïne kunt u meer last krijgen van bijwerkingen.

Soms:

- slaperigheid, rusteloosheid, nervositeit. Vooral kinderen kunnen hier last van hebben.

- hartkloppingen
- misselijkheid, braken en irritatie van de maag.

6. Gebruiksaanwijzing

Neem dit middel in met een half glas water.

7. Gebruikelijke dosering

Een capsule bevat ongeveer evenveel coffeïne als een halve kop koffie of één kop thee.

Bij vermoeidheid: 1 tot 3 keer per dag 2 tot 4 capsules.

In combinatie met een pijnstiller: 1 capsule per keer.

8. Bent u zwanger of heeft u kinderwens?

Gebruik bij voorkeur niet meer dan 2 capsules per dag. Te veel coffeïne verhoogt de kans op een miskraam.

9. Geeft u borstvoeding?

Gebruik dit middel in beperkte mate tijdens de borstvoeding. Coffeïne komt in de moedermelk terecht. Te veel coffeïne kan de baby rusteloos en prikkelbaar maken.

10. Combinatie met andere geneesmiddelen

Overleg met uw arts als u ook bepaalde astma-middelen gebruikt, zoals salbutamol en fenoterol. De kans op de bijwerking 'hartkloppingen' van deze middelen neemt toe bij combinatie met coffeïne.