

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van de arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Clotrimazol Mylan 10 mg/g, hydrofiele crème zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag de apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Clotrimazol Mylan 10 mg/g, hydrofiele crème

Algemene kenmerken

Naam van dit geneesmiddel:

Clotrimazol Mylan 10 mg/g, hydrofiele crème.

Het werkzame bestanddeel is:

Clotrimazol

Clotrimazol Mylan 10 mg/g, hydrofiele crème bevat per gram crème 10 mg clotrimazol.

Andere bestanddelen zijn:

Benzylalcohol, cetylsters, cetylstearylalcohol, octyldodecanol, polysorbaat, sorbitanmonostearaat en gezuiverd water.

Registratiehouder:

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten.

In het register ingeschreven onder:

RVG 24067=15155 - Clotrimazol Mylan 10 mg/g, hydrofiele crème.

1. Wat is Clotrimazol Mylan 10 mg/g en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:

Hydrofiele crème.

Doosje met een aluminium tube à 20 gram crème.

Geneesmiddelengroep:

Clotrimazol hoort tot de groep van het antimycotica (geneesmiddel tegen schimmelinfecties).

Clotrimazol is in staat om schimmelsoorten te doden. De crème veroorzaakt geen hinderlijke vlekken in de kleding.

Gebruiken bij:

- Huidinfecties die veroorzaakt zijn door bepaalde schimmel- of gistsoorten.

De meest voorkomende veroorzakers zijn:

- Candida soorten – gitachtige schimmels die normaal op de huid aanwezig zijn en onder bepaalde omstandigheden klachten veroorzaken.
- Dermatofyten – dit zijn huidschimmels die hoornstof (keratine) in de huid aantasten.
- Malassezia furfur – een schimmel die afschilfering en verkleuring van de huid kan veroorzaken (verwekker van de aandoening genoemd Pityriasis versicolor).

2. Wat u moet weten voordat u Clotrimazol Mylan 10 mg/g gebruikt.

Gebruik Clotrimazol Mylan 10 mg/g niet:

- wanneer u overgevoeligheid bent voor clotrimazol of één van de andere bestanddelen van de crème.

Raadpleeg uw arts indien de bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Wees extra voorzichtig met Clotrimazol Mylan 10 mg/g:

- bij overgevoeligheid voor cetylstearylalcohol. De crème dient dan niet te worden gebruikt.

Zwangerschap:

Clotrimazol Mylan 10 mg/g kan voor zover bekend zonder bezwaar in overeenstemming met het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding:

Clotrimazol Mylan 10 mg/g kan voor zover bekend zonder bezwaar in overeenstemming met het voorschrift worden gebruikt tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven. Wel dient te worden voorkomen dat de baby de crème in of om de mond krijgt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Toepassing van de crème heeft voor zover bekend geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Gebruik van Clotrimazol Mylan 10 mg/g in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Onderstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of de groep van de werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiters wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaar werking en/of bijwerking beïnvloeden.

Er zijn tot nu toe geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen gemeld.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Clotrimazol Mylan crème gebruikt?

Dosering en wijze van gebruiken:

Breng tweemaal per dag de crème op de aangedane huid aan. U herkent deze door jeuk, rode kleur, schilfers of blaasjes op de huid. Was eerst de huid en verwijder loszittende huilschilfers. Droog de huid goed af. Gebruik hierbij een schone handdoek. Breng de crème dun aan op de aangedane huid en smeer deze uit.

Duur van de behandeling:

De behandeling mag niet onderbroken worden en dient nog enige tijd te worden voortgezet nadat alle huidafwijkingen zijn verdwenen.

Gewoonlijk verdwijnen de symptomen na een behandelingsperiode van 3 tot 4 weken.

Wanneer binnen 2 weken geen duidelijke verbetering optreedt, dient u de behandeling te staken. U mag Clotrimazol Mylan 10 mg/g niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Clotrimazol Mylan 10 mg/g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Clotrimazol Mylan 10 mg/g heeft gebruikt:

Teveel aangebrachte crème kan eenvoudig met een tissue worden verwijderd. Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Clotrimazol Mylan 10 mg/g te gebruiken:

Wanneer u vergeten bent Clotrimazol Mylan 10 mg/g te gebruiken, doet u dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts.

Gebruik nooit een dubbele dosis van Clotrimazol Mylan 10 mg/g om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Clotrimazol Mylan 10 mg/g bijwerkingen veroorzaken

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- plaatselijk kunnen huidreacties optreden ten gevolge van overgevoeligheid of irritatie (jeuk, roodheid, branderig gevoel, vorming van schubben en blaasjes, vochtafscheiding, huiduitslag en netelroos).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Clotrimazol Mylan 10 mg/g?

Clotrimazol Mylan 10 mg/g buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren bij 15-25°C in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik Clotrimazol Mylan 10 mg/g niet meer nader datum op de verpakking achter 'Niet te gebruiken na:' of 'Exp.:' De aanduiding 'Exp.:' betekent: 'Niet te gebruiken na:'. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op:

Juli 2008