

NATRIUMCROMOGLICAAT 20 MG/ML TEVA
neussprayMODULE I: ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : BijsluiterDatum : 25 januari 2012
Bladzijde : 1**Natriumcromoglicaat 20 mg/ml Teva, neusspray**
natriumcromoglicaat**PATIENTENBIJSLUITER**

Lees deze bijsluiter steeds vóór het gebruik van dit geneesmiddel. Ook indien u reeds eerder Natriumcromoglicaat 20 mg/ml Teva, neusspray hebt gebruikt. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd, indien u een volgende verpakking krijgt.

ALGEMENE KENMERKEN**Naam van het geneesmiddel**

Natriumcromoglicaat 20 mg/ml Teva, neusspray.

Samenstelling

Natriumcromoglicaat 20 mg/ml Teva, neusspray bevat per ml 20 mg natriumcromoglicaat. De neusspray bevat tevens dinitriumedetaat en bezalkoniumchloride (conserveermiddel).

Farmaceutische vorm en inhoud

De neusspray is verpakt in een flacon à 15 ml of 30 ml met een doseerpompje om het geneesmiddel mee te verstuiven in de neus.

Werking

Natriumcromoglicaat remt het vrijkomen van stoffen die overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken, zodat verschijnselen als loopneus, verstopte neus en jeuk (zoals die voorkomen bij hooikoorts) worden voorkomen.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

In het register ingeschreven onder:

RVG 21467 - Natriumcromoglicaat 20 mg/ml Teva, neusspray.

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

Deze neusspray wordt toegepast ter voorkoming van ontstekingen van het slijmvlies van de neus ten gevolge van een overgevoeligheidsreactie voor een bepaalde stof (bijvoorbeeld hooikoorts).

NATRIUMCROMOGLICAAT 20 MG/ML TEVA
neusspray

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 25 januari 2012
Bladzijde : 2

VOORDAT HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT WORDT

Niet gebruiken bij:

overgevoeligheid voor benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat en/of natriumcromoglicaat.

Nodige voorzorgen bij gebruik

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding:

Indien u zwanger bent deze neusspray slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken:

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Speciale waarschuwingen en voorzorgen

Stop niet plotseling met de behandeling indien u nog blootgesteld bent aan de stoffen waar u overgevoelig voor bent aangezien dan de symptomen weer kunnen terugkeren.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dosering

De algemene dosering geldt als richtlijn en is als volgt:

Volwassenen en kinderen:

Om de 3 à 4 uur een verstuiving in elk neusgat.

Een regelmatige toediening is belangrijk, onderbreek daarom nooit zelf de behandeling.

Gebruiksaanwijzing:

1. Verwijder de beschermkap
2. Druk het pompje omlaag in de richting van de pijl en laat het daarna los.
Ga hiermee door tot de eerste vloeistof in de lucht wordt verstoven
3. Snuit eerst uw neus. Houd de verstuiver op de aangegeven wijze vast en breng de opening in een neusgat. Druk het flesje met de duim zo ver mogelijk omhoog en laat het daarna los.
Dit is één verstuiving. Doe dit nu ook voor het andere neusgat.

BIJWERKINGEN EN EVENTUELE PROBLEMEN DIE KUNNEN OPTREDEN

Raadpleeg altijd uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die **niet** wordt vermeld in deze bijsluiter of die ernstig is.

NATRIUMCROMOGLICAAT 20 MG/ML TEVA
neusspray

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 25 januari 2012
Bladzijde : 3

Natriumcromoglicaat 20 mg/ml Teva, neusspray kan in een enkel geval een lichte prikkeling van het neusslijmvlies veroorzaken aan het begin van de behandeling.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN

Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren in de goed gesloten, originele verpakking (niet in de koelkast!). Product niet blootstellen aan direct zonlicht. Op deze wijze bewaard kunt u dit geneesmiddel gebruiken tot en met de op de verpakking achter 'EXP' vermelde datum.

Wordt de flacon geopend dan is de neusspray nog 1 maand houdbaar indien bewaard volgens het voorschrift op de verpakking.

Geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen bewaren!

ALGEMENE WENKEN

Het is mogelijk dat na het lezen van de bovenstaande tekst nog vragen resteren. U kunt daarmee terecht bij uw arts of apotheker. Zij beschikken over de laatste informatie.

DATUM

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2012.

0811.1v.CA