

BIJSLUITER

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Hibicet verdunning, oplossing voor cutaan gebruik 1,5 mg/ml en 0,15 mg/ml

cetrimide en chloorhexidinedigluconaat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Hibicet verdunning en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Hibicet verdunning en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hibicet verdunning is een steriele, gebruiksklare waterige oplossing voor uitwendig gebruik die als ontsmettingsmiddel kan worden toegepast bij o.a.

- het reinigen en desinfecteren van grote, beschadigde huidoppervlakken
- behandeling van ongevalsverwondingen en brandwonden
- reiniging en desinfectie van de uitwendige geslachtsdelen tijdens de geboorte
- het reinigen van de huid rondom de plaats waar geopereerd is alvorens het verband wordt aangelegd.

De chloorhexidine in Hibicet verdunning maakt een grote groep bacteriën, schimmels en gisten onschadelijk. Het geneest echter niet de aandoeningen die door deze bacteriën, schimmels en gisten worden veroorzaakt. De cetrimide in Hibicet verdunning heeft naast een ontsmettende werking ook een reinigend effect.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

- wanneer u Hibicet verdunning in de buurt van uw ogen en/of oren gebruikt. Mocht de oplossing toch in ogen of oren terecht komen dan moet u deze onmiddellijk en grondig met water uitspoelen.
Contact met hersenvlies en hersenweefsel moet eveneens worden vermeden.

- in lichaamsholten zoals in oren, de baarmoeder of in de anus. Het inbrengen via de anus, bijvoorbeeld als zeepklysma, kan tot zeer ernstige en levensbedreigende complicaties leiden.

Hibicet verdunning mag niet worden geïnjecteerd.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen

Wees voorzichtig met het gebruik bij pasgeboren baby's, vooral bij baby's die te vroeg geboren zijn. Hibicet verdunning kan chemische brandwonden op de huid veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Bij gelijktijdig gebruik van meerdere (genees)middelen kan een wisselwerking optreden, dat wil zeggen een beïnvloeding van elkaars werking en/of bijwerking. Van Hibicet verdunning zijn echter geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Gebruik Hibicet verdunning echter niet in combinatie met andere middelen om de huid schoon te maken zoals bijvoorbeeld (vloeibare) zeep.

Indien geweven goed (zoals linnen) in contact is geweest met een chloorhexidine bevattende oplossing, moet bleken met chloorbevattende middelen worden vermeden omdat hierdoor bruine, niet verwijderbare vlekken kunnen ontstaan. Bleken met perboraat veroorzaakt deze vlekken niet.

Gebruikt u naast Hibicet verdunning nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Hibicet verdunning kan, voor zover bekend, zonder bezwaar in overeenstemming met de aanwijzingen in deze bijsluiter worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Hibicet verdunning kan, voor zover bekend, zonder bezwaar in overeenstemming met de aanwijzingen in deze bijsluiter worden gebruikt in de periode dat u borstvoeding geeft.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Omdat Hibicet verdunning uitsluitend uitwendig wordt gebruikt en er nauwelijks tot geen opname door de huid plaatsvindt, valt een beïnvloeding van de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken, niet te verwachten.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:

Hibicet verdunning mag alleen op de huid worden gebruikt. Hibicet verdunning is klaar voor direct gebruik. Als er steriel gewerkt moet worden dient de buitenzijde van het sachet of ampul vóór het openen te worden ontsmet. Een geopend sachet of ampul moet direct gebruikt worden en mag niet worden bewaard.

In geval u bemerkt dat Hibicet verdunning te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik Hibicet verdunning niet langer dan 14 dagen achtereenvolgend, zonder uw arts te raadplegen

Wat moet u doen wanneer u Hibicet verdunning heeft ingenomen?

Als Hibicet verdunning per ongeluk of moedwillig is ingeslikt kan de slokdarm en de maag ernstig geïrriteerd raken. In dat geval dient een ruime hoeveelheid melk of andere eiwithuboudende drank gedronken te worden en onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Het drinken van alcoholhoudende drank moet worden vermeden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Omdat Hibicet verdunning uitsluitend bestemd is voor uitwendige toepassing is overdosering onwaarschijnlijk. Als door veelvuldig gebruik huidirritatie ontstaat waarschuw dan uw arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u Hibicet verdunning vergeten bent te gebruiken hoeft u dit niet een extra keer te doen, maar gaat u gewoon verder met het gebruik zoals u gewend bent.

Gebruik geen dubbele hoeveelheid als u vergeten bent Hibicet verdunning te gebruiken.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U hoeft geen bijzondere maatregelen te treffen indien u plotseling met het gebruik van Hibicet verdunning stopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden, het is niet bekend hoe vaak dit gebeurt:

- Ernstige allergische reacties die sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, moeilijkheden met ademen of duizeligheid kunnen veroorzaken.

Zodra u een dergelijke reactie bemerkt moet u stoppen met het gebruik van dit middel en zo spoedig mogelijk een arts raadplegen.

Andere mogelijke bijwerkingen, waarvan ook niet bekend is hoe vaak ze optreden, zijn:

- Huidirritatie, contactdermatitis (symptomen zijn o.a. huiduitslag, rode huid, zwelling en jeuk) en galbulten.

Uitdroging van de huid en in zeldzame gevallen brandwondachtige verschijnselen zijn gemeld na herhaald gebruik van dit middel.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Een geopend sachet of ampul mag niet worden bewaard.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stoffen in dit middel zijn cetrimide (1,5 mg per milliliter oplossing) en chloorhexidinedigluconaat (0,15 mg per milliliter oplossing)
- De andere stoffen in dit middel zijn ethanol, chinolinegeel (E104), natriumhydroxide, d-gluconolacton en water.

Hoe ziet Hibicet verdunning eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Hibicet verdunning is een heldere, lichtgele oplossing.

Hibicet verdunning wordt geleverd in:

- Sachets met een inhoud van 25 ml (250 sachets per omdoos)
- Sachets met een inhoud van 100 ml (60 sachets per omdoos)
- Polyethyleen ampullen met een inhoud van 15 ml (25 of 240 ampullen per omdoos)
- Polyethyleen ampullen met een inhoud van 50 ml (120 ampullen per omdoos)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C
415 02 Göteborg
Zweden

Fabrikant

Medlock Medical Ltd.
Medlock Street
Oldham
OL1 3HS
Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder RVG 08739

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2018