

**LAXEERSTROOP TEVA**  
**667 mg/ml, stroop**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**  
**1.3.3 : Bijsluiter**

**Datum : 9 februari 2017**  
**Bladzijde : 1**

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**

**Laxeerstroop Teva 667 mg/ml, stroop**  
lactulose

**LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U.**

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Laxeerstroop Teva zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies, indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

**Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Laxeerstroop Teva en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Laxeerstroop Teva inneemt
3. Hoe wordt Laxeerstroop Teva ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Laxeerstroop Teva?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

**1. WAT IS LAXEERSTROOP TEVA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?**

**Geneesmiddelengroep**

Lactulose behoort tot de groep van de laxerende middelen (laxantia). In de dikke darm wordt lactulose afgebroken tot o.a. melkzuur en azijnzuur. Deze afbraakproducten zetten de dikke darm aan tot extra activiteit en trekken bovendien water aan, zodat de ontlasting zachter en makkelijker uit te scheiden is. Hierdoor wordt de stoelgang verbeterd. Het kan 24-48 uur duren voordat het gewenste effect optreedt.

**Gebruiken**

- verstopping (obstipatie).

**2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U LAXEERSTROOP TEVA INNEEMT**

**Gebruik Laxeerstroop Teva niet**

- wanneer u overgevoelig bent voor lactulose en verwante stoffen (galactose, lactose)
- bij plotseling optredende buikpijn of bij een afsluiting van de darmen

**LAXEERSTROOP TEVA**  
**667 mg/ml, stroop**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**  
**1.3.3 : Bijsluiter**

**Datum : 9 februari 2017**  
**Bladzijde : 2**

- bij galactosemie (een bepaalde stofwisselingsziekte, waarbij het enzym in uw bloed dat galactose omzet niet goed werkt).

**Wees extra voorzichtig met Laxeestroop Teva**

- wanneer u een bepaalde stofwisselingsziekte (galactosemie of lactasedeficiëntie) heeft: u moet rekening houden met het gehalte aan begeleidende suikers in de stroop. De stroop bevat maximaal 100 mg galactose en maximaal 60 mg lactose per ml
- als u deze stroop gebruikt bij verstopping en er geen verbetering intreedt of als de klachten zich herhalen: u moet de arts raadplegen
- bij langdurig gebruik en misbruik: dit kan leiden tot diarree en tot een verstoring van de hoeveelheid zouten in het bloed.

*Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.*

**Zwangerschap**

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

**Borstvoeding**

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

**Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Laxeestroop Teva**

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

**Gebruik van Laxeestroop Teva in combinatie met andere geneesmiddelen**

*Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.*

*De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.*

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze stroop met:

**LAXEERSTROOP TEVA**  
**667 mg/ml, stroop**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**  
**1.3.3 : Bijsluiter**

**Datum : 9 februari 2017**  
**Bladzijde : 3**

- geneesmiddelen tegen bepaalde ziektes van de dikke darm, bijv. bepaalde mesalazine tabletten.

*Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.*

### **3. HOE WORDT LAXEERSTROOP TEVA INGENOMEN?**

#### **Dosering en wijze van gebruik**

##### Dosering

De aanbevolen dosering is als volgt:

##### **Volwassenen**

30 ml per dag

##### **Kinderen van 7-14 jaar**

15 ml per dag

##### **Kinderen van 1-6 jaar**

10 ml per dag

##### **Zuigelingen**

5 ml per dag

*Als u merkt dat Laxeerstroop Teva te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*

##### Wijze van gebruik

De dosis bij voorkeur innemen bij het ontbijt. De stroop kan desgewenst worden ingenomen gemengd met water of vruchtensap. Aanbevolen wordt om tijdens het gebruik van laxerende middelen, zoals lactulose, veel te drinken (per dag 1,5-2 liter; dit komt overeen met 6-8 glazen).

Als regel kunt u na enkele dagen de dosering verlagen en aan uw individuele behoefte aanpassen. Het kan een paar dagen duren voordat het gewenste effect wordt bereikt.

*U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.*

#### **Wat u moet doen wanneer u te veel van Laxeerstroop Teva heeft ingenomen**

Wanneer u teveel van Laxeerstroop Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Wanneer u teveel Laxeerstroop Teva heeft ingenomen kunt u last krijgen van diarree.

#### **Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Laxeerstroop Teva in te nemen**

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Laxeerstroop Teva om zo de vergeten dosis in te halen.

*Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.*

**LAXEERSTROOP TEVA**  
**667 mg/ml, stroop**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**  
**1.3.3 : Bijsluiter**

**Datum : 9 februari 2017**  
**Bladzijde : 4**

#### **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kan Laxeerstroop Teva bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

##### ***Maag- en darmstelsel***

Winderigheid en een opgeblazen gevoel, vooral in het begin van de behandeling. Dit verdwijnt meestal na enkele dagen. Bij een te hoge dosering: buikpijn en diarree. Als dit optreedt, moet de dosis verlaagd worden.

*In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.*

#### **5. HOE BEWAART U LAXEERSTROOP TEVA?**

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

##### **Uiterste gebruiksdatum**

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. Na opening van de fles nog 6 maanden houdbaar.

#### **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN AANVULLENDE INFORMATIE**

##### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- Het werkzame bestanddeel is lactulose, 667 mg per ml stroop (500 mg/g).
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn niet aanwezig.

##### **Farmaceutische vorm en inhoud**

De stroop is verpakt in een glazen fles à 300 ml met kunststof maatbeker of in een kunststof fles à 300 of 500 ml met kunststof maatbeker.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

**LAXEERSTROOP TEVA**  
**667 mg/ml, stroop**

**MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS**  
**1.3.3 : Bijsluiter**

**Datum : 9 februari 2017**  
**Bladzijde : 5**

**Registratiehouder**  
Teva Nederland B.V.  
Swensweg 5  
Postbus 552  
2003 RN Haarlem  
Nederland

**In het register ingeschreven onder**  
RVG 55298

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2017.

0217.2v.EV